


白头叶猴——中国学者发现和命名的唯一的一种灵长目动物

白头叶猴是我国特产动物,由我国学者首先发现,也是唯一一种由我国学者发现和命名的灵长目动物。白头叶猴仅分布在广西左江和明江之间的一个十分狭小的三角形地带内——面积不足 200 km²,是分布范围最小的灵长类动物之一。它又叫花叶猴、白叶猴、白头乌猿;头部较小,躯体瘦削,四肢细长,尾长超过身体长度;体毛以黑色为主,头部高耸一撮直立白毛,状如一尖顶白色瓜皮小帽,故名白头叶猴。

在发现白头叶猴之前,中国动物学界只知道广西有俗称“乌猿”的黑叶猴栖息。1952年,北京动物园哺乳动物专家谭邦杰先生听说在广西还生活着一种更为稀少的“白猿”,他猜测这可能是一种由遗传变异而形成的白化型长臂猿。但后来又听说这种“白猿”长着一一条长长的尾巴,显然不可能是长臂猿,于是他又推测可能是一种白化的黑叶猴,但因为没有活的动物或者标本,也不知道这种动物的确切产地,故一时无法作出正确的结论。直到有一天,谭先生在南宁郊区的一家小中药店里,发现了一张虽然已残缺褪色但仍能看出来黑白交错的毛色和较为明显的白色头部的陈旧叶猴皮张,他才揭开了这个谜团。

据药店主人介绍,该皮张就是由传说中的“白猿”皮制作而成,采自广西南部扶绥到龙州一带。谭先生敏锐地感觉到,这的确是一种与众不同的新奇动物,与白化的或部分白化的黑叶猴均不同。由于忙于其他工作,他没能及时到产地进



行实地考察。1年后,北京动物园工作人员再次到广西工作,谭先生特别叮嘱注意对“白猿”进行考察。工夫不负苦心人,这次竟然捕捉到了一只活着的“白猿”。这种“白猿”无论是外部形态、体形大小、身体各部位比例,还是活动时的举止行为等,均与黑叶猴十分相似,只是毛色不同,在头、颈、肩、尾部的下半截、手脚背面和肘部、腿部内侧等部位为白色,而黑叶猴只是颊部有两道白纹而已。

此后,经过数年的进一步比较研究,又发现了“白猿”作为一个新种的许多证据:首先,它和黑叶

猴有几乎相同的分布区,但是却各自保持着独自的生活领域,各自组成种群,绝不混杂;其次,它们的头骨也有一些区别,“白猿”的鼻骨比黑叶猴的长,眶外宽度总大于脑壳宽度,脑壳后部不如黑叶猴显得丰满。据此,“白猿”终于被确定为一个过去未曾描述过的新物种,取名为白头叶猴。

白头叶猴的栖息地为典型的喀斯特地形,石山连绵、山峰挺拔陡峭,悬崖绝壁、岩溶溶洞随处可见,为其生存和繁衍提供了良好的自然环境。它的性情机警,十分活泼、好动,极善跳跃;它喜欢集群生活,早出晚归,生活很有规律。白头叶猴主要在秋季交配,春季产仔。自 20 世纪 70 年代始,由于人口数量不断膨胀,白头叶猴栖息地内的大部分地方都被开垦为农田,原本茂密的植被常年被农民砍伐用作薪柴,同时,当地传统的生产方式“开山炸石”使林立的石山满目疮痍,植被被毁坏,白头叶猴的栖息地由此越来越小。此外,白头叶猴那时还承受着人们肆意的猎杀;即使在禁止捕杀白头叶猴的法规已颁布的今天,偷猎现象仍屡禁不止,因而对白头叶猴种群造成了最直接也是最致命的威胁。目前,白头叶猴仅集中分布在广西崇左市江州区的弄官山区和扶绥的弄廉两片山区中,分布面积不到 80 km²,种群数量仅剩 700 多只。因此,保护白头叶猴迫在眉睫。

本期封面为白头叶猴生活图,由邹映雪设计制作。

(李湘涛 供稿)