其他

基于“非小细胞肺癌（中晚期）小剂量紫杉醇同步化疗的护理干预分析”的评论

肺癌作为一种常见的恶性肿瘤，已波及全球，同时也属于我国恶性肿瘤死亡率较高的疾病之一。非小细胞肺癌存在恶性程度高和致死率较高的特点，主要包括鳞状细胞癌、大细胞癌、腺癌等。非小细胞肺癌的临床特点为肿瘤细胞生长分裂较慢，与其他肿瘤细胞相比，扩散时间相对较晚。通常在临床确诊断时，患者大多处于非小细胞肺癌的中晚期，且五年生存率较低，紫衫醇同步化疗是临床较为常见的治疗手段，但是此方案需要接受长时间的治疗，对患者的身体和心理都会造成较大程度的影响。所以对非小细胞肺癌中晚期的患者实施针对性护理措施进行有效干预，是改善治疗效果和减轻各种不良反应的重要方式。

《抗癌新药紫杉醇和多烯紫杉醇》一书由元英进、葛志强等共同编著，2002 年 12 月由化学工业出版社出版。本书在编著过程中注重实用性，全面系统介绍了紫杉醇和多烯紫杉醇的情况，旨在满足临床使用。全书共分为 9 个章节，第一章概述了紫杉醇类抗肿瘤药物的制备方法，第二章详细介绍了紫杉醇的分离纯化工艺，第三章则探讨了紫杉醇和多烯紫杉醇的半合成方法，内容新颖丰富。第四至第七章主要围绕植物细胞培养紫杉醇的条件、紫杉醇结构与活性的关系、紫杉醇的生物合成、紫杉醇新剂型等内容进行分析，极大提高了读者对紫杉醇的认识，让读者多维度了解紫杉醇。第八至第九章针对紫杉醇和多烯紫杉醇的临床前研究及临床研究展开描述，反映了紫杉醇和多烯紫杉醇的研究进展和应用程度。整本书重点突出了对抗肿瘤药物的研究与分析，体现了医学上对药物治疗肿瘤疾病的重视。

基于制药分析非小细胞肺癌（中晚期）小剂量紫杉醇同步化疗的护理干预分析一例评价《抗癌新药紫杉醇和多烯紫杉醇》一书：本书是结合国内外研究进展，在大量研究工作的基础上汇总的关于紫杉醇和多烯紫杉醇的全面科学性知识。随着肺癌的患病率逐年增加，紫杉醇的使用剂量也成为临床用药上值得进一步研究的课题。对患者来说，增加紫杉醇剂量时产生的不良反应也在增加，而且治疗耐受性会明显下降。因此考虑适宜的紫杉醇用药剂量具有积极的现实意义。大多非小细胞肺癌患者在确诊时已失去最佳的手术机会，而单纯进行化疗通常疗效不佳。如今同步化疗作为一种综合治疗的新模式，在非小细胞肺癌的治疗上具有显著的临床价值。

《抗癌新药紫杉醇和多烯紫杉醇》一书在编著过程中，不仅对紫杉醇的制备方法及临床研究进行了细致分析，还描述了多烯紫杉醇的相关知识。紫杉醇可从红豆杉属植物的树皮中通过分离提取得到，但这样的制备方法存在很大缺陷；目前制取紫杉醇主要采用组织和细胞培养、化学合成等方法。紫杉醇是近几年来应用于临床的一种新型广谱抗肿瘤药物，主要通过抗微管作用来抑制肿瘤细胞的有丝分裂，让细胞周期同步化，实现药效。有研究显示，小剂量紫杉醇同步化疗属于治疗中晚期非小细胞肺癌的可行方法。但部分患者存在个体差异，在使用化疗药物紫杉醇的过程中可能会出现各种不良反应，因此须给予患者有效的护理干预措施以提高化疗效果，主要包括化疗前护理、心理护理和化疗不良反应的护理。在接受化疗前，要对患者进行化疗知识宣教，因为大多数患者及其家属缺乏对化疗的认识。为他们普及关于化疗和营养的重要性、治疗过程中可能出现的不良反应以及配合治疗的相关事项，可减少患者的恐惧感和不安。通过心理护理能更好地关注患者的心理变化，及时对其进行心理疏导和干预，能让患者对治疗充满信心，以积极的心态面对疾病。低剂量紫杉醇与化疗同步治疗也会增加不良反应的发生率，比如出现过敏、骨髓抑制、消化道刺激等。因此，要做好化疗不良反应的护理，就应该在正式施行紫杉醇治疗前对患者做好相应的抗过敏处理，如采取在化疗前静推地塞米松等措施以避免出现严重的过敏反应；同时要做好隔离措施，适当减少人员探视，保证病房内的卫生和消毒情况良好，及时监测患者血常规，做好呼吸道及泌尿道护理等。总之，良好的护理干预会让患者在心态与状态优良的前提下，积极配合治疗，减轻不良反应的严重程度，从而提升护理满意度。

综上所述，《抗癌新药紫杉醇和多烯紫杉醇》一书深入阐述了诸多领域中紫杉醇和多烯紫杉醇的研究成果，全面提升了读者关于抗肿瘤药物的认识，书中的每个章节内容，都做到了详细有序。同时，本书提供了许多研究结果与图表内容，便于相关学者进行参考借鉴，有利于提高紫杉醇和多烯紫杉醇的资源利用度，造福恶性肿瘤患者。

莫菱云，翁国勤（嘉兴市第二医院胸外及血管外科，浙江嘉兴 314000）