

# 藜麦灰霉病防治药剂的筛选、复配及其防效



徐紫璐<sup>1</sup> 马馨蕊<sup>1</sup> 赵雨<sup>1</sup> 秦楠<sup>1,2</sup> 殷辉<sup>1,2</sup>  
赵晓军<sup>1,2\*</sup> 任璐<sup>1,2\*</sup>

(1. 山西农业大学植物保护学院, 太原 030031; 2. 山西农业大学农业有害生物综合治理山西省重点实验室, 太原 030031)

**摘要:** 为明确有效防治藜麦灰霉病的药剂, 测定12种杀菌剂对藜麦灰霉菌灰葡萄孢菌 *Botrytis cinerea* 的抑制效果和室内毒力, 筛选出两种作用位点不同的杀菌剂进行复配, 明确复配药剂的最佳体积比和配方, 并通过离体叶片试验、室内盆栽试验和大田试验综合测定复配药剂对藜麦灰霉病的防效。结果显示: 氟唑菌酰胺、啞菌酯、戊唑醇和吡唑醚菌酯对灰葡萄孢菌的室内毒力均较好, 抑制中浓度  $EC_{50}$  分别为 0.49、0.39、0.09 和 0.03  $\mu\text{g}/\text{mL}$ ; 选择氟唑菌酰胺与戊唑醇进行复配, 当氟唑菌酰胺与戊唑醇按照 4:6 和 5:5 体积比复配时, 毒性比率分别为 1.49 和 1.37, 表现增效作用; 当氟唑菌酰胺与戊唑醇按照 9:2 质量比复配时, 增效作用最大, 增效系数达 2.85; 高、中浓度的复配药剂处理后, 离体叶片试验的保护防效和治疗防效为 94.97%~97.18%, 室内盆栽试验的保护防效和治疗防效为 71.45%~82.01%, 田间防效分别为 87.77% 和 79.91%, 均高于其他处理; 且高、中浓度的复配药剂处理能显著提高藜麦产量。表明当 200 g/L 氟唑菌酰胺悬浮剂与 430 g/L 戊唑醇悬浮剂有效成分按质量比 9:2 (200  $\mu\text{g}/\text{mL}$  氟唑菌酰胺+44.4  $\mu\text{g}/\text{mL}$  戊唑醇和 160  $\mu\text{g}/\text{mL}$  氟唑菌酰胺+35.6  $\mu\text{g}/\text{mL}$  戊唑醇) 复配不仅可有效防治藜麦灰霉病, 而且能显著增加藜麦产量。

**关键词:** 灰葡萄孢菌; 氟唑菌酰胺; 戊唑醇; 复配; 防效; 配方; 田间试验

## Screening, compounding of fungicides and their control effect against gray mold of *Chenopodium quinoa*

Xu Zilu<sup>1</sup> Ma Xinrui<sup>1</sup> Zhao Yu<sup>1</sup> Qin Nan<sup>1,2</sup> Yin Hui<sup>1,2</sup> Zhao Xiaojun<sup>1,2\*</sup> Ren Lu<sup>1,2\*</sup>

(1. College of Plant Protection, Shanxi Agricultural University, Taiyuan 030031, Shanxi Province, China;

2. Shanxi Key Laboratory of Integrated Pest Management in Agriculture; Shanxi Agricultural University, Taiyuan 030031, Shanxi Province, China)

**Abstract:** To identify effective fungicides for the control of gray mold in quinoa *Chenopodium quinoa*, the inhibitory effects and *in vitro* toxicity of 12 fungicides against pathogen *Botrytis cinerea* were determined. Two fungicides with different modes of action were selected for combination, and the optimal volume ratio and formulation of the combined fungicides were determined. The efficacy of the combined fungicides against gray mold in quinoa was comprehensively evaluated through *in vitro* leaf tests, *in vitro* pot experiments and field trials. The results showed that pydiflumetofen, azoxystrobin, tebuconazole and pyraclostrobin had significant *in vitro* toxicity against *B. cinerea*, with  $EC_{50}$  values of 0.49, 0.39, 0.09 and 0.03  $\mu\text{g}/\text{mL}$ , respectively. When the volume ratio of pydiflumetofen to tebuconazole was 4:6 and 5:5, it showed a synergistic effect, with toxicity ratios of 1.49 and 1.37, respectively. When the

基金项目: 山西省重点研发计划项目(2022ZDYF117), “特”“优”农业高质量发展科技支撑工程项目(TYGC26), 山西省现代农业产业技术体系建设专项(2025CYJSTX03-31)

\* 通信作者 (Authors for correspondence), E-mail: renlubaby@163.com, zhaoxiaojun0218@163.com

收稿日期: 2025-09-23

mass ratio of pydiflumetofen and tebuconazole was 9:2, the synergistic effect was optimal, and the synergistic coefficient was 2.85. After treatment with high and medium concentrations of the combined fungicides, the protective and treatment effect on *in vitro* leaves were 94.97%–97.18%, and the protective and treatment effect of indoor pot experiments were 71.45%–82.01%. The field control effects of the high and medium concentrations of the compound fungicides were 87.77% and 79.91%, respectively, which were higher than other treatments, and could significantly increase the yield of quinoa. It was indicated that the field recommended concentration of 200 g/L pydiflumetofen suspension concentrate (SC) and 430 g/L tebuconazole SC at a mass ratio of 9:2 (200 µg/mL pydiflumetofen + 44.4 µg/mL tebuconazole and 160 µg/mL pydiflumetofen + 35.6 µg/mL tebuconazole) could not only effectively control gray mold in quinoa, but also significantly increase quinoa yield.

**Key words:** *Botrytis cinerea*; pydiflumetofen; tebuconazole; mixture; efficacy; recipe; field experiment

藜麦 *Chenopodium quinoa* 是苋科一年生草本植物,富含蛋白质、矿物质等多种营养(任贵兴等, 2015),有“粮食之母”(Vega-Gálvez et al., 2010)和“营养黄金”的美誉(陶诗秀, 2018)。1987年,中国西藏自治区首次引入种植藜麦(张崇玺等, 1994); 2008年山西省开始大规模种植藜麦,近些年随着种植面积的不断扩大,多种病害频繁发生(王昶等, 2025)。灰霉病是近年来在藜麦种植区普遍发生的一种病害,该病害由真菌灰葡萄孢菌 *Botrytis cinerea* 引起,通常发生在藜麦灌浆期,主要侵染穗主轴、侧轴及籽粒,发病部位出现不规则坏死病斑,严重田块的发病率超过 60%,严重影响其产量(殷辉等, 2022)。目前针对该病害的防治措施仍然依赖化学手段,但在生产实践中连续使用单一杀菌剂极易引起病原菌产生抗性。因此,筛选防治藜麦灰霉病的复配制剂迫在眉睫(王雅玲等, 2009)。

氟唑菌酰胺属于琥珀酸脱氢酶抑制剂(succinate dehydrogenase inhibitor, SDHI)类杀菌剂,是由先正达公司研发的新型杀菌剂,该杀菌剂为病菌呼吸抑制剂,主要通过干扰呼吸链复合体 II 来阻止能量合成,从而抑制病菌生长,杀死病菌(Hou et al., 2017)。氟唑菌酰胺因具有结构新颖、活性高、杀菌广谱的特点而被广泛用于防治多种作物的真菌病害(邓红霞和钱跃言, 2017)。此外,与苯并咪唑、三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂不同,氟唑菌酰胺不容易与其他种类的杀菌剂产生交互抗性(冷伟锋等, 2022)。目前,根据中国农药信息网(<http://www.chinapesticide.org.cn>)及相关报道显示,氟唑菌酰胺已在中国登记用于小麦赤霉病(向礼波等, 2018)、花生叶斑病(孙名帅等, 2025)等多种植物真菌病害的防治。2022年先正达公司研发的杀菌剂 Postiva 在美国上市,该杀菌剂由氟唑菌酰胺与苯

醚甲环唑复配,用于防治园艺作物的灰霉病、叶斑病及白粉病等;先正达公司在澳大利亚又推出一种预防性杀菌剂 Miravis Prime,该杀菌剂由氟唑菌酰胺与咯菌腈复配,用于防治葡萄灰霉病(汪国庆等, 2024)。戊唑醇是拜耳公司研发的三唑类杀菌剂,属于甾醇脱甲基抑制剂(sterol demethylation inhibitor, DMI),其主要通过抑制病原真菌中麦角甾醇的生物合成(齐艳丽等, 2020)来增加细胞壁的厚度,致使病原菌菌丝的形态和结构发生变形,从而达到抑制病原真菌生长的目的(韩青梅等, 2005; Li et al., 2015),同时具有保护和治疗的作用(华乃震, 2013); 可用于防治子囊菌、半知菌、担子菌等大多数病原真菌所引起的病害(黄世文等, 2022)。例如,胡妍月等(2021)研究表明 96% 戊唑醇对猕猴桃灰霉病有较好的防效,适合在猕猴桃果园推广使用;李宝燕等(2024)研究表明 30% 啞菌环胺·戊唑醇对葡萄灰霉病的田间防效可达 90%。此外,戊唑醇还能促进作物及其根系生长,提高作物产量(栾晖, 2025)。因此,本研究拟分析氟唑菌酰胺与戊唑醇复配的可行性及其对藜麦灰霉病的防效。

为有效防治藜麦灰霉病,从中国农药信息网查询,选择已经取得农药登记并在生产中用于防治灰霉病的 12 种杀菌剂,测定其对藜麦灰霉病菌灰葡萄孢菌的抑制效果和室内毒力,筛选出两种作用位点不同的杀菌剂进行复配,明确复配药剂的最佳体积比和配方,并通过离体叶片、室内盆栽和大田试验综合测定复配药剂对藜麦灰霉病的防效,以期为实际生产中藜麦灰霉病的防控提供备选复配药剂。

## 1 材料与方法

### 1.1 材料

供试植物和菌株:离体叶片及室内盆栽试验藜

麦品种为稼琪 100, 田间试验藜麦品种为晋藜 6 号, 均由山西农业大学农作物品种资源研究所提供。灰葡萄孢菌由山西农业大学植物保护学院杂粮病害课题组分离纯化, 置于马铃薯葡萄糖琼脂(potato dextrose agar, PDA)培养基斜面上于 4 °C 恒温保存; 在无菌操作条件下, 将 PDA 斜面上保存的菌株转接到 PDA 平板上, 25 °C 下培养 7 d, 打取直径 5 mm 的菌饼备用。

PDA 培养基成分: 马铃薯 200 g、葡萄糖 20 g、琼脂粉 17 g、蒸馏水 1 L。

药剂和仪器: 97.3% 戊唑醇(tebuconazole)原药, 山东华阳科技股份有限公司; 97.2% 咪鲜胺(prochloraz)原药、97% 吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)原药, 山东潍坊润丰化工有限公司; 97.1% 啉菌酯(azoxystrobin)原药、98% 多菌灵(carbendazim)原药, 山东西亚化学工业有限公司; 96% 乙霉威(dimethocarb)原药, 河北威远生物化工股份有限公司; 98% 氟唑菌酰胺(pydiflumetofen)原药, 上海勤路生物技术有限公司; 97% 苯并烯氟菌唑(benzovindiflupyr)原药、95% 联苯吡菌胺(bixafen)原药、98.50% 氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)原药、96% 氟吡菌酰胺(fluopyram)原药, 国家农药质量检验检测中心; 97% 啶酰菌胺(boscalid)原药, 湖北健源化工有限公司; 200 g/L 氟唑菌酰胺(pydiflumetofen)悬浮剂, 先正达南通作物保护有限公司; 430 g/L 戊唑醇(tebuconazole)悬浮剂, 禾美思(山东)植物保护有限公司; 99% 水杨羟肟酸(salicylhydroxamic acid, SHAM), 北京索莱宝科技有限公司。SX-MD16E-2 背负式喷雾器, 中国市下控股有限公司。

## 1.2 方法

### 1.2.1 不同单剂对灰葡萄孢菌抑制效果的测定

将戊唑醇、咪鲜胺、吡唑醚菌酯、啉菌酯、多菌灵、乙霉威、氟唑菌酰胺、苯并烯氟菌唑、联苯吡菌胺、氟唑菌酰胺、啶酰菌胺和氟吡菌酰胺这 12 种杀菌剂的原药均溶于丙酮中, 将 SHAM 溶于甲醇中, 配制浓度均为  $1 \times 10^4$   $\mu\text{g/mL}$  的母液, 于 4 °C 保存, 备用。采用菌丝生长速率法(慕立义, 1994)测定各杀菌剂单剂对灰葡萄孢菌的抑制作用。将各杀菌剂母液分别用无菌水稀释至 100  $\mu\text{g/mL}$  和 10  $\mu\text{g/mL}$ , 将其分别按 1:9 体积比添加到 PDA 培养基中, 制成含药浓度分别为 10  $\mu\text{g/mL}$  和 1  $\mu\text{g/mL}$  的平板, 以不加杀菌剂的 PDA 培养基为对照。取直径为 5 mm 的灰葡萄孢菌菌饼, 分别接种到 PDA 含药平板中央, 每个处理重复 3 次。接种后置于温度 25 °C、光周期 12 L:12 D 的培养箱中培养, 5 d 后采用十字交叉法

测量菌落直径, 计算抑制率。抑制率=(对照的菌落直径-处理的菌落直径)/(对照的菌落直径-5)×100%。选择抑制率较好的 4 种单剂进行室内毒力测定。

### 1.2.2 不同单剂对灰葡萄孢菌室内毒力的测定

根据 1.2.1 结果, 选择吡唑醚菌酯、氟唑菌酰胺、啉菌酯和戊唑醇这 4 种单剂进行室内毒力测定。根据预试验结果, 在每种杀菌剂对病原菌抑制率为 15%~85% 时对应的浓度之间设 5 个浓度梯度, 吡唑醚菌酯的终浓度分别为 0.1、0.5、5、25、50  $\mu\text{g/mL}$ , 氟唑菌酰胺的终浓度分别为 0.5、1、5、10、20  $\mu\text{g/mL}$ , 啉菌酯的终浓度分别为 0.1、0.5、1、2.5、5  $\mu\text{g/mL}$ , 戊唑醇的终浓度分别为 0.05、0.1、0.2、0.5、1  $\mu\text{g/mL}$ , 按照 1.2.1 方法分别制成含药平板。啉菌酯和吡唑醚菌酯属于甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂, 需在 PDA 培养基中加入 SHAM 抑制旁路氧化途径, 保证采用菌丝生长速率法测定甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂对菌丝抑制率的准确性, 其终浓度为 100  $\mu\text{g/mL}$ ; 以含终浓度为 100  $\mu\text{g/mL}$  SHAM 的 PDA 培养基为对照。取直径 5 mm 的灰葡萄孢菌菌饼, 按照 1.2.1 方法接种, 每个处理重复 3 次。接种后置于温度 25 °C、光周期 12 L:12 D 的培养箱中培养, 5 d 后采用十字交叉法测量菌落直径, 计算抑制率。以不同杀菌剂浓度对数值为自变量、以抑制率为因变量进行线性回归分析, 根据毒力回归方程计算抑制中浓度  $EC_{50}$ 、95% 置信区间和相关系数。根据  $EC_{50}$  筛选 3 种作用机制不同的单剂进行复配。

### 1.2.3 复配药剂的筛选

根据 1.2.2 结果, 选择氟唑菌酰胺、吡唑醚菌酯和戊唑醇这 3 种作用机制不同的单剂进行复配。将这 3 种杀菌剂浓度调至  $EC_{50}$ , 将氟唑菌酰胺分别与吡唑醚菌酯和戊唑醇按 1:1 体积比进行两两复配, 然后将这 3 种复配药剂和各单剂分别与 PDA 培养基按 1:9 体积比混合制成含药平板, 含吡唑醚菌酯的 PDA 平板中同 1.2.2 需加入 SHAM 抑制旁路氧化途径, 分别以加入等量无菌水和终浓度 100  $\mu\text{g/mL}$  SHAM 的 PDA 培养基作为对照 1(CK1) 和对照 2(CK2)。取直径 5 mm 的灰葡萄孢菌菌饼, 按照 1.2.1 方法接种, 每个处理重复 3 次。接种后置于温度 25 °C、光周期 12 L:12 D 的培养箱中培养, 5 d 后采用十字交叉法测量菌落直径, 计算抑制率, 即各处理对灰葡萄孢菌的实际抑制率。按照公式计算理论抑制率和毒性比率(范腕腕等, 2026)。理论抑制率=单剂 A 的实际抑制率×单剂 A 在混剂中的体积百分比+单剂 B 的实际抑制率×单剂 B 在混剂中的体

积百分百。毒性比率=实际抑制率/理论抑制率。当毒性比率<0.75时两种杀菌剂表现为拮抗作用;当0.75≤毒性比率≤1.25时两种杀菌剂表现为相加作用;当毒性比率>1.25时两种杀菌剂表现为增效作用。根据结果,选择戊唑醇和氟唑菌酰胺进行复配。

#### 1.2.4 复配药剂最佳体积比的确定

将氟唑菌酰胺和戊唑醇的浓度调至 $EC_{50}$ ,将其体积比分别设置为10:0、9:1、8:2、7:3、6:4、5:5、4:6、3:7、2:8、1:9、0:10,按照1.2.1方法分别制成含药PDA平板,以加入等量清水的PDA培养基为空白对照;取直径5 mm的灰葡萄孢菌菌饼,按照1.2.1方法接种,每个处理重复3次。接种后置于温度25℃、光周期12 L:12 D的培养箱中培养,5 d后采用十字交叉法测量菌落直径,计算抑制率,即实际抑制率,方法同1.2.1,再计算理论抑制率及毒性比率,公式同1.2.3。计算这11种配比的含药PDA平板中氟唑菌酰胺和戊唑醇的质量浓度,并以两者之和作为该配比的测试浓度。根据最佳毒性比率确定氟唑菌酰胺和戊唑醇的最佳体积比为4:6和5:5。

#### 1.2.5 复配药剂的配方优化

将 $EC_{50}$ 的氟唑菌酰胺和 $EC_{50}$ 的戊唑醇复配体积比4:6和5:5换算为质量比,分别为3.63:1和5.45:1,以这两个质量比为基础分别设置3:1、7:2、4:1、9:2、5:1、11:2、6:1七个质量比复配处理,按照1.2.1方法分别制成含药PDA平板。取直径5 mm的灰葡萄孢菌菌饼,按照1.2.1方法接种,每个处理重复3次。接种后置于温度25℃、光周期12 L:12 D的培养箱中培养,5 d后采用十字交叉法测量菌落直径,计算抑制率,即实际抑制率,方法同1.2.1。按公式计算理论 $EC_{50}$ 和增效系数(张江兆等,2022)。

理论 $EC_{50} = \frac{a+b}{\frac{a}{EC_{50}(A)} + \frac{b}{EC_{50}(B)}}$ ,式中, $a$ 、 $b$ 分别为

单剂A和单剂B在复配剂中的质量比。增效系数=理论 $EC_{50}$ /实际 $EC_{50}$ 。当增效系数<0.5时复配药剂表现为拮抗作用,当0.5≤增效系数≤1.5时复配药剂表现为相加作用,当增效系数>1.5时复配药剂表现为增效作用。根据结果确定氟唑菌酰胺和戊唑醇的质量比,即配方。

#### 1.2.6 复配药剂的室内离体叶片防效测定

复配药剂保护防效的测定:试验共设5个杀菌剂处理。将200 g/L氟唑菌酰胺悬浮剂与430 g/L戊唑醇悬浮剂按质量比9:2复配,将该复配剂依次配制成高浓度(200 μg/mL氟唑菌酰胺+44.4 μg/mL戊唑醇)、中浓度(160 μg/mL氟唑菌酰胺+35.6 μg/mL戊唑醇)和低浓度(120 μg/mL氟唑菌酰胺+26.7 μg/mL戊唑醇),以200 g/L氟唑菌酰胺单剂(浓度为260 μg/mL)、430 g/L戊唑醇单剂(浓度为215 μg/mL)为对照药剂。在无菌操作条件下,将PDA斜面上保存的菌株转接到PDA平板上,25℃下培养7 d,向培养皿中注入20 mL无菌水,使用三角涂布棒刮下菌丝和孢子,无菌纱布过滤获得孢子悬浮液,用无菌水将其浓度调至 $1 \times 10^6$ 个/mL。取藜麦稃100种子,种于直径15 cm、高14 cm的盆中,将盆置于温度25℃、光周期12 L:12 D、相对湿度75%的温室中,常规管理60 d,选取生长状况一致、大小相似且未施用过任何杀菌剂的藜麦叶片,75%乙醇溶液消毒1~2 min,无菌水彻底清洗干净后自然晾干。将叶片置于含有湿润滤纸的培养皿中,每皿1片叶片,用喷壶向叶片表面均匀喷施不同处理的杀菌剂,直至雾滴滴落为止,以喷施清水作为对照;每个处理10片叶片(1个重复),每个处理重复3次;处理后置于温度25℃、光周期12 L:12 D、湿度适中的培养箱中培养3 d,然后置于温度25℃、光周期12 L:12 D、相对湿度95%条件下保湿培养24 h,再向叶片喷施浓度为 $1 \times 10^6$ 个/mL的灰葡萄孢菌分生孢子悬浮液,继续于温度25℃、光周期12 L:12 D、相对湿度95%条件下保湿培养,3 d后采用十字交叉法测量病斑直径,计算病斑面积和保护防效,保护防效=(清水对照的病斑面积-处理的病斑面积)/清水对照的病斑面积×100%(刘婕等,2024)。复配药剂治疗防效的测定:方法同上,仅是先对叶片喷施浓度为 $1 \times 10^6$ 个/mL的灰葡萄孢菌分生孢子悬浮液,上述条件下培养24 h后再向叶片喷施不同处理的杀菌剂,培养条件同上。3 d后测量病斑直径,计算病斑面积,方法同上。

1.2.7 复配药剂的室内盆栽防效测定

取藜麦稃100种子,种于直径15 cm、高14 cm的盆中,置于温度25℃、光周期12 L:12 D、相对湿度75%的温室中培养,每盆两株,每天定期浇适量水,培养120 d后供试。复配药剂保护防效的测定:选取健康且长势一致的藜麦苗,向藜麦穗先分别喷施不同处理的杀菌剂,各处理同1.2.6,至穗部完全浸润,24 h后再喷施浓度为 $1 \times 10^6$ 个/mL的灰葡萄孢菌分生孢子悬浮液。每个处理10盆藜麦(1个重复),重复3次。施药后7 d调查藜麦穗部的发病情况,根据《农药田间药效试验准则(一)杀菌剂防治蔬菜灰霉病》(GB/T 17980.28—2000)标准确定病级,计算病情指数和保护防效(何海涛等,2023)。病情指数=

$\Sigma$  (病级数×该病级植株数)/(最大病级数×植株总株数)×100; 保护防效=(对照的病情指数-处理的病情指数)/对照的病情指数×100%。复配药剂治疗防效的测定: 仅是向藜麦穗先喷施浓度为 $1 \times 10^6$ 个/mL的灰葡萄孢菌分生孢子悬浮液, 24 h后再向藜麦穗分别喷施不同处理的杀菌剂, 至穗部完全浸润, 其他方法同上。

### 1.2.8 复配药剂的田间防效及藜麦产量的测定

2021年在山西省忻州市静乐县丰润镇进行田间试验。土壤为壤土, 略碱性, 有机质含量中等。5月中旬种植藜麦, 人工开穴播种, 株距25 cm, 行距45 cm, 播深1~2 cm, 每小区405穴, 每穴播种2粒。第1次施药时间为2021年8月19日(温度为12~27℃, 阴转晴, 东北风1级), 施药前藜麦灰霉病零星发生, 药前病情指数可计为0; 7 d后进行第2次施药, 时间为2021年8月26日(温度为13~21℃, 阴转晴, 西北风1级)。施药时, 用水量750 L/hm<sup>2</sup>, 对整株均匀喷洒, 共6个处理, 处理及浓度同1.2.6。每个处理3次重复, 共18个小区, 每个小区长20 m、宽2 m, 小区随机区组设置。第2次施药7 d后调查藜麦的防病情况, 按1.2.7方法计算病情指数和防效; 同时参照李伟龙等(2001)方法观察各处理后藜麦植株有无药害情况, 记录药害的类型(失绿、畸形、灼伤、叶片皱缩等)和严重程度。2021年9月23日待藜麦成熟时测产, 各小区单收、单晒、计产, 参照祁志刚和裴雪霞(2015)方法测定各小区的千粒重, 将小区的产量换算为每公顷产量。

### 1.3 数据分析

采用SPSS 20.0软件对数据进行统计分析, 应用Duncan氏新复极差法进行差异显著性检验。

## 2 结果与分析

### 2.1 不同单剂对灰葡萄孢菌的抑制效果

在10 μg/mL浓度下, 戊唑醇和啞菌酯对灰葡萄孢菌的抑制率均为100.00%, 吡唑醚菌酯和氟唑菌

酰羟胺对灰葡萄孢菌的抑制率分别为82.24%和71.38%, 抑制效果仅次于戊唑醇、啞菌酯, 其余药剂的抑制率介于10.65%~69.70%之间(表1)。在1 μg/mL浓度下, 戊唑醇、啞菌酯、吡唑醚菌酯和氟唑菌酰羟胺对灰葡萄孢菌的抑制率分别达到88.68%、56.09%、62.75%和59.61%, 其余药剂的抑制率介于4.21%~54.87%之间。因此, 选择戊唑醇、啞菌酯、吡唑醚菌酯和氟唑菌酰羟胺这4种杀菌剂进行室内毒力测定。

表1 不同单剂对灰葡萄孢菌的抑制率

Table 1 Inhibition rates of different fungicides against *Botrytis cinerea*

杀菌剂 Fungicide	不同浓度的抑制率 Inhibitory rate of different concentrations/%	
	10 μg/mL	1 μg/mL
	戊唑醇 Tebuconazole	100.00±0.00 a
咪鲜胺 Prochloraz	69.70±3.12 cd	54.11±1.15 d
啞菌酯 Azoxystrobin	100.00±0.00 a	56.09±0.76 cd
吡唑醚菌酯 Pyraclostrobin	82.24±0.93 b	62.75±1.97 b
乙霉威 Dimethocarb	67.80±0.89 d	54.87±1.36 d
氟唑菌酰羟胺 Pydiflumetofen	71.38±1.09 c	59.61±0.22 bc
苯并烯氟菌唑 Benzovindiflupyr	35.29±0.68 h	9.80±0.39 h
联苯吡菌胺 Bixafen	23.53±1.36 i	18.04±0.39 g
氟吡菌酰胺 Fluopyram	41.18±0.68 g	16.86±0.78 g
氟唑菌酰胺 Fluxapyroxad	45.88±0.68 f	23.92±0.39 f
多菌灵 Carbendazim	10.65±0.65 j	4.21±1.02 i
啞菌酯 Boscalid	51.05±0.32 e	22.86±1.44 f

表中数据为平均数±标准差。同列不同小写字母表示经Duncan氏新复极差法检验差异显著( $P < 0.05$ )。Data are mean±SE. Different lowercase letters within the same column indicate significant difference according to Duncan's new multiple range test ( $P < 0.05$ ).

### 2.2 4种单剂对灰葡萄孢菌的室内毒力

戊唑醇、啞菌酯、吡唑醚菌酯、氟唑菌酰羟胺这4种单剂对灰葡萄孢菌的抑制效果均较强,  $EC_{50}$ 分别为0.09、0.39、0.03和0.49 μg/mL(表2)。

表2 4种杀菌剂对灰葡萄孢菌的室内毒力

Table 2 Indoor toxicity of four fungicide against *Botrytis cinerea*

杀菌剂 Fungicide	毒力回归方程 Toxicity regression equation	95%置信限 95% confidence limit/(μg/mL)	$EC_{50}$ /(μg/mL)	相关系数 Coefficient
氟唑菌酰羟胺 Pydiflumetofen	$y=0.40x_1+5.12$	0.23-0.84	0.49	0.967
啞菌酯 Azoxystrobin	$y=0.65x_1+5.26$	0.26-0.55	0.39	0.968
戊唑醇 Tebuconazole	$y=1.17x_1+6.22$	0.06-0.12	0.09	0.956
吡唑醚菌酯 Pyraclostrobin	$y=0.20x_1+5.30$	0.01-0.11	0.03	0.984

$x_1$ : 杀菌剂浓度的对数值;  $y$ : 抑制率。  $x_1$ : The logarithm of the concentration of the fungicide;  $y$ : inhibition rate.

### 2.3 复配药剂的筛选

当氟唑菌酰胺与戊唑醇按照 1:1 体积比复配时对灰葡萄孢菌的毒性比率为 1.27, 表现为增效作用, 而当氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯按照 1:1 体积

比复配时对灰葡萄孢菌的毒性比率为 0.90, 表现为相加作用(表 3)。因此, 选择氟唑菌酰胺与戊唑醇进行复配。

表 3 3 种杀菌剂复配对灰葡萄孢菌的抑制率和毒性比率

Table 3 Inhibition rate and toxicity ratio of combinations for three fungicides against *Botrytis cinerea*

处理 Treatment	菌落直径 Colony diameter/cm	实际抑制率 Actual inhibition rate/%	理论抑制率 Theoretical inhibition rate/%	毒性比率 Toxic ratio
氟唑菌酰胺 Pydiflumetofen	3.98	42.83±0.90 b	-	-
戊唑醇 Tebuconazole	4.08	41.40±1.22 b	-	-
吡唑醚菌酯 Pyraclostrobin	2.36	54.70±0.48 a	-	-
氟唑菌酰胺与戊唑醇复配 Combination of pydiflumetofen and tebuconazole	3.26	53.48±1.10 a	42.12	1.27
氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯复配 Combination of pydiflumetofen and pyraclostrobin	2.92	43.91±3.66 b	48.77	0.90
加入无菌水的对照平板 Control plate with sterile water (CK1)	6.96	-	-	-
加入水杨羟肟酸的对照平板 Control plate with salicylhydroxamic acid (CK2)	5.21	-	-	-

表中数据为平均数±标准差。同列不同小写字母表示经 Duncan 氏新复极差法检验差异显著 ( $P<0.05$ )。Data are mean±SE. Different lowercase letters within the same column indicate significant difference according to Duncan's new multiple range test ( $P<0.05$ ).

### 2.4 复配药剂的最佳体积比

当氟唑菌酰胺与戊唑醇的体积比为 4:6 和 5:5 时对灰葡萄孢菌的毒性比率最大, 分别为 1.49 和 1.37, 且表现为增效作用; 当氟唑菌酰胺与戊唑

醇的体积比为 6:4 和 7:3 时对灰葡萄孢菌的毒性比率均为 1.28, 也表现为增效作用; 而其余 7 种配比的毒性比率均小于 1.25, 均表现为相加作用(表 4)。因此, 氟唑菌酰胺与戊唑醇按照 4:6 和 5:5 的体积比复配。

表 4 氟唑菌酰胺与戊唑醇按不同体积比复配对灰葡萄孢菌的抑制率和毒性比率

Table 4 Inhibition rate and toxicity ratio of the mixture of flusilazole and tebuconazole with different volume ratios against *Botrytis cinerea*

氟唑菌酰胺与戊唑醇的体积比 Volume ratio of pydiflumetofen to tebuconazole	菌落直径 Colony diameter/cm	实际抑制率 Actual inhibition rate/%	理论抑制率 Theoretical inhibition rate/%	毒性比率 Toxic ratio
10:0	2.82	51.91±0.93 d	51.93	1.00
9:1	2.73	58.45±0.98 c	51.25	1.14
8:2	2.54	62.13±1.78 bc	50.59	1.23
7:3	2.43	64.09±0.70 b	49.93	1.28
6:4	2.47	63.31±0.51 b	49.27	1.28
5:5	2.30	66.47±0.46 b	48.61	1.37
4:6	2.03	71.53±1.66 a	47.95	1.49
3:7	3.76	39.44±1.83 f	47.29	0.83
2:8	3.82	38.20±2.27 f	46.63	0.82
1:9	3.27	48.49±1.99 de	45.97	1.05
0:10	3.22	45.31±1.48 e	45.31	1.00

表中数据为平均数±标准差。同列不同小写字母表示经 Duncan 氏新复极差法检验差异显著 ( $P<0.05$ )。Data are mean±SE. Different lowercase letters within the same column indicate significant difference according to Duncan's new multiple range test ( $P<0.05$ ).

## 2.5 复配药剂的配方

氟唑菌酰胺与戊唑醇按7种质量比复配后对灰葡萄孢菌的实际 $EC_{50}$ 介于0.09~0.22  $\mu\text{g/mL}$ 之间,其中质量比为3:1时的实际 $EC_{50}$ 最小,而质量比为11:2时的实际 $EC_{50}$ 最大(表5)。氟唑菌酰胺与戊唑醇按7种质量比复配后的增效系数介于1.35~2.85

之间,其中质量比为11:2时的增效系数为1.35,小于1.50,表现为相加作用;其余质量比时均表现为增效作用,且质量比为9:2时的增效系数最大,为2.85,实际 $EC_{50}$ 为0.10  $\mu\text{g/mL}$ (表5)。因此,氟唑菌酰胺与戊唑醇按照9:2质量比复配。

表5 氟唑菌酰胺与戊唑醇按不同质量比复配对灰葡萄孢菌的室内毒力和增效系数  
Table 5 Indoor toxicity and synergistic coefficient of the mixture of flusilazole and tebuconazole with different mass ratios against *Botrytis cinerea*

氟唑菌酰胺与戊唑醇质量比 Mass ratio of pydiflumetofen to tebuconazole	毒力回归方程 Toxicity regression equation	$EC_{50}/(\mu\text{g/mL})$		相关系数 Correlation coefficient	增效系数 Synergistic coefficient
		实测值 Measured value	理论值 Theoretical value		
3:1	$y=0.77x_2+5.86$	0.09	0.23	0.985	2.48
7:2	$y=0.95x_2+5.91$	0.11	0.24	0.980	2.16
4:1	$y=0.88x_2+5.83$	0.11	0.26	0.981	2.33
9:2	$y=1.01x_2+6.03$	0.10	0.27	0.979	2.85
5:1	$y=0.54x_2+5.42$	0.16	0.28	0.988	1.73
11:2	$y=0.45x_2+5.30$	0.22	0.29	0.971	1.35
6:1	$y=0.38x_2+5.30$	0.16	0.30	0.980	1.87

$x_2$ : 复配药剂的不同质量比;  $y$ : 抑制率。  $x_2$ : Different mass ratios of bactericidal compound agents;  $y$ : inhibition rate.

## 2.6 复配药剂的室内离体叶片防效

复配药剂对藜麦离体叶片均有良好的保护作用和治疗作用,且均随着复配药剂浓度的升高而增加。高、中、低浓度的复配药剂对藜麦灰霉病的治疗防效分别为96.61%、94.97%和87.64%,显著高于氟唑菌酰胺和戊唑醇单剂的治疗防效( $P<0.05$ ,表6)。高、中浓度的复配药剂对藜麦叶片的保护防效分别达97.18%和95.00%,显著高于戊唑醇单剂的保护防效( $P<0.05$ ),但与氟唑菌酰胺单剂的保护防效差异不显著;低浓度的复配药剂对藜麦叶片的保护防效为92.38%,显著高于戊唑醇单剂的保护防效( $P<0.05$ ),但与氟唑菌酰胺单剂的保护防效差异不显著(表6)。

## 2.7 复配药剂的室内盆栽防效

高、中浓度的复配药剂对盆栽藜麦的保护防效分别为79.67%和73.10%,治疗防效分别为82.01%和71.45%,显著高于其他大部分处理( $P<0.05$ );低浓度的复配药剂对盆栽藜麦的保护防效为66.32%,显著高于戊唑醇单剂的保护防效( $P<0.05$ ),但与氟唑菌酰胺单剂的保护防效差异不显著;低浓度的复配药剂对盆栽藜麦灰霉病的治疗防效为67.13%,显著高于氟唑菌酰胺单剂的治疗防效( $P<0.05$ ),但与戊唑醇单剂的治疗防效差异不显著(表6)。

## 2.8 复配药剂的田间防效

氟唑菌酰胺单剂、戊唑醇单剂及两者3种浓度的复配药剂对藜麦灰霉病均有一定的防效。高浓度的复配药剂对藜麦灰霉病的田间防效最高,为87.77%,显著高于其他处理( $P<0.05$ );中浓度的复配药剂的田间防效次之,为79.91%,显著高于其他处理( $P<0.05$ );低浓度的复配药剂的田间防效与戊唑醇单剂的田间防效差异不显著,但两者均显著高于氟唑菌酰胺单剂( $P<0.05$ ,表7)。

## 2.9 复配药剂对藜麦产量的影响

末次施药7 d后,杀菌剂使用剂量范围内未见藜麦有矮化、褪绿、畸形等药害症状,表明试验所用杀菌剂对藜麦安全,也未发现对其他非靶标生物有影响。氟唑菌酰胺单剂、戊唑醇单剂及两者3种浓度的复配药剂均能减轻植物病害,且均对藜麦有不同程度的增产作用(表7)。高浓度的复配药剂处理后,藜麦千粒重最高,为2.74 g,显著高于其他处理( $P<0.05$ ),藜麦产量也最高,增产率达21.38%;中浓度的复配药剂处理后,藜麦产量次之,显著高于低浓度的复配药剂、氟唑菌酰胺单剂和对照( $P<0.05$ ),但与戊唑醇单剂处理差异不显著,增产率为17.17%(表7)。

表6 不同浓度复配药剂的室内离体叶片防效和室内盆栽防效

Table 6 Indoor efficacy of detached leaves and pot cultivation of a combination of flusadone and tebuconazole at different concentrations

处理 Treatment	有效成分及浓度 Effective component and concentration	离体叶片 Detached leaves		盆栽 Pot cultivation	
		治疗防效 Therapeutic effect	保护防效 Protection effect	治疗防效 Therapeutic effect	保护防效 Protection effect
高浓度复配药剂 High-concentration compound agent	200 μg/mL 氟唑菌酰胺+44.4 μg/mL 戊唑醇 200 μg/mL pydiflumetofen+44.4 μg/mL tebuconazole	96.61± 0.31 a	97.18± 0.38 a	82.01± 0.17 a	79.67± 0.94 a
中浓度复配药剂 Medium-concentration compound agent	160 μg/mL 氟唑菌酰胺+35.6 μg/mL 戊唑醇 160 μg/mL pydiflumetofen+35.6 μg/mL tebuconazole	94.97± 0.31 a	95.00± 1.28 ab	71.45± 1.56 b	73.10± 1.09 b
低浓度复配药剂 Low-concentration compound agent	120 μg/mL 氟唑菌酰胺+26.7 μg/mL 戊唑醇 120 μg/mL pydiflumetofen+ 26.7 μg/mL tebuconazole	87.64± 1.09 b	92.38± 0.48 b	67.13± 0.92 c	66.32± 1.03 c
200 g/L 氟唑菌酰胺 200 g/L pydiflumetofen	260 μg/mL	72.76± 0.51 d	94.6± 1.80 ab	61.42± 1.54 d	68.79± 1.14 c
430 g/L 戊唑醇 430 g/L tebuconazole	215 μg/mL	81.30± 0.86 c	80.91± 0.58 c	69.38± 0.30 bc	57.70± 2.91 d

表中数据为平均数±标准差。同列不同小写字母表示不同处理之间经 Duncan 氏新复极差法检验差异显著 ( $P<0.05$ )。Data are mean±SE. Different lowercase letters within the same column indicate significant differences among different treatments according to Duncan's new multiple range test ( $P<0.05$ ).

表7 不同浓度复配药剂的田间防效及对藜麦产量的影响

Table 7 Field efficacy and impact on quinoa yield of a combination of flusadone and tebuconazole at different concentrations

处理 Treatment	有效成分及浓度 Effective component and concentration	田间防效 Field efficacy/%	千粒重 Thousand seed weight/g	小区产量 Plot yield/kg	产量 Output/(kg/hm <sup>2</sup> )	增产率 Yield increasing rate/%
高浓度复配药剂 High-concentration compound agent	200 μg/mL 氟唑菌酰胺+ 44.4 μg/mL 戊唑醇 200 μg/mL pydiflumetofen+ 44.4 μg/mL tebuconazole	87.77±0.87 a	2.74±0.04 a	3.40±0.06 a	1 702.06±28.77 a	21.38
中浓度复配药剂 Medium-concentration compound agent	160 μg/mL 氟唑菌酰胺 +35.6 μg/mL 戊唑醇 160 μg/mL pydiflumetofen+ 35.6 μg/mL tebuconazole	79.91±1.16 b	2.66±0.03 b	2.29±0.05 ab	1 643.08±26.39 ab	17.17
低浓度复配药剂 Low-concentration compound agent	120 μg/mL 氟唑菌酰胺+ 26.7 μg/mL 戊唑醇 120 μg/mL pydiflumetofen+ 26.7 μg/mL tebuconazole	71.62±1.57 c	2.58±0.04 c	3.09±0.10 c	1 545.96±48.25 c	10.25
200 g/L 氟唑菌酰胺 200 g/L pydiflum etofen	260 μg/mL	62.88±0.44 d	2.57±0.04 c	3.10±0.08 c	1 548.85±40.03 c	10.45
430 g/L 戊唑醇 430 g/L tebuconazole	215 μg/mL	70.74±1.15 c	2.69±0.03 ab	3.17±0.07 bc	1 588.00±35.22 bc	13.24
对照 CK			2.51±0.05 d	2.81±0.04 d	1 402.27±18.49 d	—

表中数据为平均数±标准差。同列不同小写字母表示不同处理之间经 Duncan 氏新复极差法检验差异显著 ( $P<0.05$ )。Data are mean±SE. Different lowercase letters within the same column indicate significant differences among different treatments according to Duncan's new multiple range test ( $P<0.05$ ).

### 3 讨论

农药复配是目前农业生产中防治植物病害的有

效措施之一。将不同机制的杀菌剂复配可以提高防效,拓展防治谱,增加持效性和减少用药量。例如,噁唑酰胺与吡唑醚菌酯按质量比1:1复配可有效抑

制烟草靶斑病菌 *Rhizoctonia solani*, 与单剂防效相同的前提下可减少杀菌剂用量(刘婕等, 2024); 己唑醇与氟唑菌酰胺或咯菌腈等复配不仅可以有效防治小麦赤霉病, 还可延缓田间病原菌对己唑醇的抗性发展, 从而有效防控病害, 保护作物生产安全(李梦雨等, 2024)。因此, 本研究从12种杀菌剂中筛选出戊唑醇和氟唑菌酰胺两种作用机制不同的杀菌剂进行复配。

戊唑醇为三唑类杀菌剂, 而氟唑菌酰胺属SDHI类杀菌剂, 这两种杀菌剂作用机理不同, 不仅不易与其他种类的杀菌剂产生交互抗性(冷伟锋等, 2022), 而且对其他种类的杀菌剂还有增效作用。例如, 氟唑菌酰胺与咪鲜胺按照3:2质量比复配时增效作用最大, 对枸杞根腐病菌 *Fusarium solani* 的  $EC_{50}$  为  $0.04 \mu\text{g/mL}$ , 可作为防治枸杞根腐病的最佳配方(张恒等, 2022); 武夷菌素与啞菌环胺按照9:1体积比复配时增效作用最明显, 对葡萄灰霉病菌的毒性比率为1.678, 对葡萄灰霉病的离体叶片防效和田间防效分别为75.19%和66.67%, 比单剂防效分别增加了16.53%~26.35%和19.05%~30.16%(张晓翠等, 2025)。本研究结果显示氟唑菌酰胺与戊唑醇按照9:2质量比复配时, 增效系数最大,  $EC_{50}$  为  $0.10 \mu\text{g/mL}$ , 与已有研究一致。因此, 200 g/L 氟唑菌酰胺与430 g/L 戊唑醇复配可用来防治藜麦灰霉病。

在实际应用中, 杀菌剂对病害的防效受诸多因素影响。本研究通过离体叶片试验、室内盆栽试验以及大田试验综合证实氟唑菌酰胺与戊唑醇的复配药剂对藜麦灰霉病有较好的防效。氟唑菌酰胺与其他杀菌剂复配对灰葡萄孢菌引起的灰霉病均有较好的抑制效果。例如, 400 g/L 氟唑菌酰胺·咯菌腈悬浮剂施用7 d和14 d后对香葱灰霉病的防效较好, 分别为81.91%和86.58%(胡吉峰等, 2023); 200 g/L 氟唑菌酰胺悬浮剂对大樱桃灰霉病的防效大于70%(刘永春和祁之秋, 2023); 浓度为400  $\mu\text{g/mL}$  的50%丙烷脒·氟唑菌酰胺对葡萄灰霉病的防效可达54.06%, 高于同剂量下单剂的防效(许贯友等, 2025)。本研究结果显示, 高、中浓度的氟唑菌酰胺和戊唑醇复配药剂对藜麦灰霉病的田间防效分别为87.77%和79.91%, 显著高于两个单剂处理; 与胡吉峰等(2023)的研究结果相似, 但高于许贯友等(2025)的研究结果, 究其原因可能是地区和气候不同, 或者菌株对农药的敏感性不同。此外, 本研究结果显示, 高、中浓度的氟唑菌酰胺和戊唑醇复配药

剂处理后, 藜麦千粒重与产量均显著高于对照, 低浓度的氟唑菌酰胺和戊唑醇复配药剂、200 g/L 氟唑菌酰胺和430 g/L 戊唑醇处理的藜麦千粒重与产量也较对照有不同程度的增加。聂登等(2021)研究表明施用氟唑菌酰胺杀菌剂可使小麦产量增加11.2%, 与本研究结果一致。而章启程和孙俊铭(2026)的研究结果显示长期施用30% 脲菌·戊唑醇悬浮剂、35% 氟吡·戊唑醇悬浮剂和40% 丙硫·戊唑醇悬浮剂可使小麦增产16.38%~35.15%, 高于本研究结果, 可能是复配药剂浓度和生长期施用次数不同所致。

本研究对氟唑菌酰胺与戊唑醇复配药剂的防效进行了充分验证, 但两者增效机理尚不明确, 后续会进一步探索这两种杀菌剂的增效机理, 以期延缓植物病害对杀菌剂的抗性, 为田间藜麦灰霉病的用药提供指导。

## 参 考 文 献 (References)

- Deng HX, Qian YY. 2017. Research development of new-type bactericide-pydiflumetofen. Zhejiang Chemical Industry, 48(11): 31-33 (in Chinese) [邓红霞, 钱跃言. 2017. 新型杀菌剂氟唑菌酰胺研究进展. 浙江化工, 48(11): 31-33]
- Fan WW, Ma YH, Liu J, Guo XP, Yang YY. 2026. Synergistic effect of *Bacillus velezensis* YJ02 combined with thifluzamide on peanut southern blight. Chinese Journal of Biological Control, 42(1): 35-43 (in Chinese) [范腕腕, 马毅辉, 刘杰, 郭雪萍, 杨玉媛. 2026. 贝莱斯芽孢杆菌 YJ02 复配噻呋酰胺对花生白绢病增效防治作用. 中国生物防治学报, 42(1): 35-43]
- Han QM, Kang ZS, Huang LL, Zhao J. 2005. Cytological studies of effects of tebuconazole on infection process of *Fusarium graminearum* on wheat spikes. Journal of Plant Protection, 32(1): 57-62 (in Chinese) [韩青梅, 康振生, 黄丽丽, 赵杰. 2005. 戊唑醇对小麦赤霉病菌侵染影响的细胞学研究. 植物保护学报, 32(1): 57-62]
- He HT, Tang YN, Gu XH, Zhai QH, Wang SL, Xu XW, Pan HY, Zhang H. 2023. Fungicides screening and field application for controlling soybean root rot. Agrochemicals, 62(1): 55-58 (in Chinese) [何海涛, 唐雅楠, 顾学虎, 翟乾行, 王双龙, 许焯炜, 潘洪玉, 张浩. 2023. 防治大豆根腐病的药剂筛选及田间应用. 农药, 62(1): 55-58]
- Hou YP, Mao XW, Wang JX, Zhan SW, Zhou MG. 2017. Sensitivity of *Fusarium asiaticum* to a novel succinate dehydrogenase inhibitor fungicide pydiflumetofen. Crop Protection, 96: 237-244
- Hu JF, Tan XF, Wu Q, Jiang ZC, Wu XM. 2023. Control effect in field of five fungicides against grey mould of *Allium ascalonicum*. Journal of Mountain Agriculture and Biology, 42(5): 73-77 (in Chinese) [胡吉峰, 谈孝凤, 吴琼, 江兆春, 吴小毛. 2023. 5种杀菌剂对香葱灰霉病的田间防效. 山地农业生物学报, 42(5): 73-77]

- Hu YY, Sun Y, Guo MC, Tu GQ, Zhao SG, Huang SJ. 2021. Evaluation on the control effects of eight fungicides on kiwifruit gray mold disease and brown spot disease. *Hunan Agricultural Sciences*, (4): 82–85 (in Chinese) [胡妍月, 孙杨, 郭明程, 涂贵庆, 赵尚高, 黄水金. 2021. 8种药剂对猕猴桃灰霉病和褐斑病的防治效果评价. *湖南农业科学*, (4): 82–85]
- Hua NZ. 2013. Formulation and application of fungicide tebuconazole. *Agrochemicals*, 52(11): 781–786, 809 (in Chinese) [华乃震. 2013. 杀菌剂戊唑醇的剂型与应用. *农药*, 52(11): 781–786, 809]
- Huang SW, Liu LM, Zhao KH, Zhang YL. 2022. Phytotoxic mechanisms of triazole fungicides on rice plants and their solutions. *Plant Protection*, 48(4): 107–113 (in Chinese) [黄世文, 刘连盟, 赵可菡, 章艺琳. 2022. 三唑类杀菌剂对水稻药害机理及解决方案. *植物保护*, 48(4): 107–113]
- Leng WF, Zhao H, Liu S, Liu BY. 2022. A new pesticide fluconazole hydroxylamine. *Yantai Fruits*, (3): 36–39 (in Chinese) [冷伟锋, 赵红, 刘松, 刘保友. 2022. 新型农药氟唑菌酰胺. *烟台果树*, (3): 36–39]
- Li BY, Luan BH, Shi J, Liu BY. 2024. Verification of effective mixture for controlling grape diseases. *Yantai Fruits*, (4): 10–13 (in Chinese) [李宝燕, 栾炳辉, 石洁, 刘保友. 2024. 防治葡萄重要病害的有效混剂产品验证. *烟台果树*, (4): 10–13]
- Li JL, Liu XY, Di YL, Liang HJ, Zhu FX. 2015. Baseline sensitivity and control efficacy of DMI fungicide epoxiconazole against *Sclerotinia sclerotiorum*. *European Journal of Plant Pathology*, 141(2): 237–246
- Li MY, Gao XH, Qian L/Y, Jiang J, Liu SM. 2024. Inhibitory activity of hexaconazole and its mixtures against *Fusarium graminearum* in Henan Province and its indoor control efficacy against *Fusarium* head blight. *Chinese Journal of Pesticide Science*, 26(3): 540–548 (in Chinese) [李梦雨, 高续恒, 钱乐, 姜佳, 刘圣明. 2024. 己唑醇及其复配剂对河南省禾谷镰孢菌的抑制活性及对小麦赤霉病的室内防效. *农药学报*, 26(3): 540–548]
- Li WL, Lin J, Zhan HM. 2001. Effects of four triazole fungicides on tomato growth. *Shanghai Vegetables*, (1): 29–30 (in Chinese) [李伟龙, 林俊, 占红木. 2001. 四种三唑类杀菌剂对番茄生长的影响. *上海蔬菜*, (1): 29–30]
- Liu J, Zhou ZH, Guo Y, Xiao YS, Zhou XP, Teng K, Xiao ZP, Liu TB, Yi TY. 2024. Antifungal activity of the combination of thifuzamide and pyraclostrobin against *Rhizoctonia solani* and its indoor control efficacy against tobacco target spot. *Chinese Journal of Pesticide Science*, 26(4): 773–780 (in Chinese) [刘婕, 周泽华, 郭瑶, 肖艳松, 周向平, 滕凯, 肖志鹏, 刘天波, 易图永. 2024. 噁唑酰胺与吡唑醚菌酯复配对烟草靶斑病菌的抑制活性及对烟草靶斑病的室内防效. *农药学报*, 26(4): 773–780]
- Liu YC, Qi ZQ. 2023. Fungicide screening and field application against cherry gray mold. *Agrochemicals*, 62(7): 521–522, 533 (in Chinese) [刘永春, 祁之秋. 2023. 大樱桃灰霉病防治药剂筛选与应用. *农药*, 62(7): 521–522, 533]
- Luan H. 2025. Control efficacy and application of pyraclostrobin and tebuconazole combined formulation against two rice and wheat diseases. Master thesis. Yangzhou: Yangzhou University (in Chinese) [栾晖. 2025. 吡唑醚菌酯·戊唑醇复配剂对两种稻麦病害的防治效果及应用. 硕士学位论文. 扬州: 扬州大学]
- Mu LY. 1994. Research methods of phytochemical protection. Beijing: China Agriculture Press, pp. 79–82 (in Chinese) [慕立义. 1994. 植物化学保护研究方法. 北京: 中国农业出版社, pp. 79–82]
- Nie D, Fei XX, Zhao XX, Yin Y. 2021. Effects of three fungicides on yield, quality and food safety of wheat. *Grain Storage*, 50(5): 28–32 (in Chinese) [聂登, 费杏兴, 赵欣欣, 殷月. 2021. 3种杀菌剂对小麦产量、品质与食用安全的影响分析. *粮食储藏*, 50(5): 28–32]
- Qi YL, Li JD, Gao J, Li CY, Ren PC, Song JX, Wang X, Qiao XW, Qin S. 2020. Residue behavior and dietary risk assessment of tebuconazole and pyraclostrobin in corn. *Chinese Journal of Pesticide Science*, 22(1): 115–121 (in Chinese) [齐艳丽, 李晋栋, 高婧, 李春勇, 任鹏程, 宋晋雄, 王霞, 乔雄梧, 秦曙. 2020. 戊唑醇及吡唑醚菌酯在玉米上的残留行为及风险评估. *农药学报*, 22(1): 115–121]
- Qi ZG, Pei XX. 2015. Effects of three bactericides on yield and quality of two wheat varieties. *Journal of Shanxi Agricultural Sciences*, 43(11): 1476–1478 (in Chinese) [祁志刚, 裴雪霞. 2015. 3种杀菌剂对小麦产量和品质的影响. *山西农业科学*, 43(11): 1476–1478]
- Ren GX, Yang XS, Yao Y. 2015. Current situation of quinoa industry in China. *Crops*, (5): 1–5 (in Chinese) [任贵兴, 杨修仕, 么杨. 2015. 中国藜麦产业现状. *作物杂志*, (5): 1–5]
- Sun MS, Li S, Min XF, Zhang F, Tian DY, Du L, Ge XT. 2025. Field efficacy evaluation of several SDHI fungicides for peanut leaf spot. *Modern Agrochemicals*, 24(5): 81–83, 87 (in Chinese) [孙名帅, 李圣, 闵祥芬, 张芳, 田东亚, 杜龙, 葛晓甜. 2025. 几种SDHI类杀菌剂防治花生叶斑病田间药效评价. *现代农药*, 24(5): 81–83, 87]
- Tao SX. 2018. Counting the edible value of “nutritional gold” quinoa. *Healthy Life*, (2): 48 (in Chinese) [陶诗秀. 2018. 细数“营养黄金”藜麦的食用价值. *健康人生*, (2): 48]
- Vega-Gálvez A, Miranda M, Vergara J, Uribe E, Puente L, Martínez EA. 2010. Nutrition facts and functional potential of quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.), an ancient Andean grain: a review. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 90(15): 2541–2547
- Wang C, Min GM, Zhang LJ, Lu JY, Niu ZX, Wei YM, Yang FR. 2025. Progress in research on quinoa downy mildew and its integrated control. *Acta Prataculturae Sinica*, 34(9): 194–205 (in Chinese) [王昶, 闵庚梅, 张丽娟, 陆建英, 牛早霞, 魏玉明, 杨发荣. 2025. 藜麦霜霉病及其综合防控研究进展. *草业学报*, 34(9): 194–205]
- Wang GQ, Zhang B, Li HC. 2024. Overview of key SDHI fungicides with patent expiry from 2022 to 2033. *Agrochemicals*, 63(12): 859–870 (in Chinese) [汪国庆, 张斌, 李慧超. 2024. 2022—2033年专利到期的SDHI类重点杀菌剂品种概述. *农药*, 63(12): 859–870]
- Wang YL, Sun LN, Yang DB, Yuan HZ. 2009. Influence of seed-treatment with tebuconazole and difenoconazole on maize seedling growth. *Crops*, (4): 60–63 (in Chinese) [王雅玲, 孙丽娜, 杨代斌, 袁会珠. 2009. 戊唑醇和苯醚甲环唑种子处理对玉米幼苗生长的影响比较. *作物杂志*, (4): 60–63]

- Xiang LB, Yang LJ, Xue MF, Zhang XJ, Zeng FS, Shi WQ, Song YS, Gong SJ, Yu DZ. 2018. Sensitivity of *Fusarium graminearum* to pydiflumetofen and its field efficacy on *Fusarium* head blight. Chinese Journal of Pesticide Science, 20(4): 445-451 (in Chinese) [向礼波, 杨立军, 薛敏峰, 张学江, 曾凡松, 史文琦, 宋远胜, 龚双军, 喻大昭. 2018. 禾谷镰孢菌对氟唑菌酰胺敏感性基线的建立及药剂田间防效. 农药学学报, 20(4): 445-451]
- Xu GY, Chen GY, Li XL, Gao YQ, Lei P, Feng JT, Wang Y, Ma ZQ. 2025. Preparation of water dispersible granule formulation of propanil and fluxapyroxad. Chinese Journal of Pesticide Science, 27(3): 484-491 (in Chinese) [许贯友, 陈光友, 李向丽, 高艳清, 雷鹏, 冯俊涛, 王勇, 马志卿. 2025. 丙烷脒与氟唑菌酰胺复配水分散粒剂的制备. 农药学学报, 27(3): 484-491]
- Yin H, Chen YL, Qin N, Zhou JB, Ren L, Zhao XJ. 2022. Identification of the pathogen causing quinoa gray mold and effects of environmental factors on its mycelial growth and conidial germination. Journal of Plant Protection, 49(3): 899-908 (in Chinese) [殷辉, 陈亚蕾, 秦楠, 周建波, 任璐, 赵晓军. 2022. 藜麦灰霉病病原菌鉴定及环境因子对其菌丝生长. 植物保护学报, 49(3): 899-908]
- Zhang CX, Zhang CX, Wang M. 1994. Experimental study on low temperature freezing injury of QUinoa at seedling stage. Tibetan Journal of Agricultural Sciences, 16(4): 49-54 (in Chinese) [张崇玺, 贡布扎西, 旺姆. 1994. 南美藜(QUinoa)苗期低温冻害试验研究. 西藏农业科技, 16(4): 49-54]
- Zhang H, He J, Zhang XY, Zhang SH, Li YX, Zhang JH, Cheng Y, Li HL. 2022. Virulence synergism of pydiflumetofen and prochloraz complex to Chinese wolfberry root rot. Journal of Northwest Forestry University, 37(1): 152-158 (in Chinese) [张恒, 何静, 张小彦, 张树衡, 李彦湘, 张金花, 程永, 李红磊. 2022. 氟唑菌酰胺与咪鲜胺复配对枸杞根腐病菌的毒力增效作用. 西北林学院学报, 37(1): 152-158]
- Zhang JZ, Xu CX, Shen Y, Gao MJ, Lu LN, Lu F, Liu XJ. 2022. Allied toxicity and residual dynamics of procymidone and fludioxonil on gray mold of cucumber. Chinese Journal of Pesticide Science, 24(4): 851-858 (in Chinese) [张江兆, 徐重新, 沈燕, 高美静, 卢莉娜, 卢飞, 刘贤金. 2022. 腐霉利和咯菌腈混用对黄瓜灰霉病菌的联合毒力及药剂残留动态. 农药学学报, 24(4): 851-858]
- Zhang QC, Sun JM. 2026. Study on the control effect and yield-increasing effect of mixed use of drugs and fertilizers on wheat scab and sheath blight. Modern Agricultural Science and Technology, (1): 73-76 (in Chinese) [章启程, 孙俊铭. 2026. 药肥混用对小麦赤霉病和纹枯病的防效及增产效果研究. 现代农业科技, (1): 73-76]
- Zhang XC, Xu CL, Zhou QY, Liao YT, Shi LM, Ge BB. 2025. Control effect of wuyiencin and cyprodinil on *Botrytis cinerea*. Chinese Journal of Biological Control, 41(1): 156-164 (in Chinese) [张晓翠, 许春丽, 周倩影, 廖珂彤, 施李鸣, 葛蓓蓓. 2025. 武夷菌素与啞菌环胺复配防治葡萄灰霉病. 中国生物防治学报, 41(1): 156-164]

(责任编辑:张俊芳)